

CONDITIONS D'UN PRELEVEMENT GENITAL CHEZ LA FEMME

Ref : IT-MU-TOUS-052-01
Version : 01
Applicable le : 20-02-2015



LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE
BIOSMOSE idf

**PRELEVEMENT VAGINAL OU CERVICO-VAGINAL
POUR ANALYSE CYTO-BACTERIOLOGIQUE ET MYCOLOGIQUE**

Le respect des conditions suivantes est indispensable à l'obtention de résultats interprétables pour l'analyse de votre prélèvement vaginal / cervico-vaginal

- ⤴ Eviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons...) ainsi que tout rapport sexuel dans les 24 heures précédant le prélèvement.
- ⤴ Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle car la flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur).
- ⤴ Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (au moins 15 jours pour la recherche de Chlamydiae, au moins 5 jours pour les germes banaux).

CONDITIONS D'UN PRELEVEMENT GENITAL CHEZ LA FEMME

Ref : IT-MU-TOUS-052-01
Version : 01
Applicable le : 20-02-2015



LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE
BIOSMOSE idf

**PRELEVEMENT VAGINAL OU CERVICO-VAGINAL
POUR ANALYSE CYTO-BACTERIOLOGIQUE ET MYCOLOGIQUE**

Le respect des conditions suivantes est indispensable à l'obtention de résultats interprétables pour l'analyse de votre prélèvement vaginal / cervico-vaginal

- ⤴ Eviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons...) ainsi que tout rapport sexuel dans les 24 heures précédant le prélèvement.
- ⤴ Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle car la flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur).
- ⤴ Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (au moins 15 jours pour la recherche de Chlamydiae, au moins 5 jours pour les germes banaux).