

CONDITIONS D'UN PRELEVEMENT GENITAL CHEZ L'HOMMERef : IT-MU-TOUS-051-01
Version : 01
Applicable le : 20-02-2015

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE

BIOSMOSE idf**PRELEVEMENT URETHRAL OU BALANO-PREPUTIAL
POUR ANALYSE CYTO-BACTERIOLOGIQUE ET MYCOLOGIQUE**

Le respect des conditions suivantes est indispensable à l'obtention de résultats interprétables pour l'analyse de votre prélèvement uréthral / balano-préputial.

- ⤴ Le prélèvement est à effectuer au moins 3 heures après une miction urinaire.
- ⤴ Le patient devra éviter toute toilette intime et tout traitement local (crème, gels, savons...) avant le prélèvement.
- ⤴ Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique : au moins 15 jours pour la recherche de Chlamydiae, au moins 5 jours pour les germes banaux (sauf contexte particulier et contrôle de traitement).

Laboratoire BIOSMOSE idf**Page 1 / 1****CONDITIONS D'UN PRELEVEMENT GENITAL CHEZ L'HOMME**Ref : IT-MU-TOUS-051-01
Version : 01
Applicable le : 20-02-2015

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE

BIOSMOSE idf**PRELEVEMENT URETHRAL OU BALANO-PREPUTIAL
POUR ANALYSE CYTO-BACTERIOLOGIQUE ET MYCOLOGIQUE**

Le respect des conditions suivantes est indispensable à l'obtention de résultats interprétables pour l'analyse de votre prélèvement uréthral / balano-préputial.

- ⤴ Le prélèvement est à effectuer au moins 3 heures après une miction urinaire.
- ⤴ Le patient devra éviter toute toilette intime et tout traitement local (crème, gels, savons...) avant le prélèvement.
- ⤴ Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique : au moins 15 jours pour la recherche de Chlamydiae, au moins 5 jours pour les germes banaux (sauf contexte particulier et contrôle de traitement).

Laboratoire BIOSMOSE idf**Page 1 / 1**